

ト高雄、Bakyu (漢字不明) カラノ標本ガコノ種ニアタルモノデアツタ。以前ニ紅頭嶼カラ *P. quadrifida* トシテ報告サレ、後ニ *P. quadrifida* var. *formosana* ト訂正サレ、最近 *P. formosana* ナル特産種トシテ認メラレル様ニナツタ植物ハ上記ノモノニ關係ガナイモノデ、コレハ寧ロすべりひゆ型ノモノデアル。(津山 尙)

○ たいわんわだんノ瘦果

Crepidiastrum koshunense (HAYATA) NAKAI ノ瘦果ハ早田博士ノ原記載ニヨルト全然平滑ノ様ニ記シテアリ、ソノ點デ内地ノわだんと比較シテアル。最近、恒春、K. MIYAKE トアル原標本ヲ調べテ見タラ瘦果ガ未ダ若ク一見平滑ニ見エタ。併シ、驚愕鼻デ早田博士ノ採集サレタ標本ニハ充分成熟シタ瘦果ガアリ、コレニヨツテ見ルト「瘦果ニハ下方 2/3 位ノ所迄ハ殆ンド平滑カ又ハ單細胞ノ小疣狀ノ極小突起ガアルガ 2/3 ヨリ上方デハ疣ハ段々ト鋭イ齒ノ様ナ單細胞ノ透明ナ突起又ハ短毛トナツテキテ、シカモソレガ密ニ分布シテキル」ノガ正シイ事ヲ知ツタ。(津山 尙)

○ マリアナ群島ノ *Myoporum* ニ就イテ

Myoporum aff. *tenuifolium* FORSTER f. トシテ金平亮三博士ニヨリマリアナ群島ノ南部ノロタ、テニアン兩島カラ發表サレタモノガアル。コレハ初島佳彦氏ニヨリ *Myoporum tenuifolium* ソレ自身トシテ認メラレ、ニューカレドニア、濠洲北部ヨリロタ、テニアン兩島ヲ經テ小笠原島ニ迄分布スルモノトサレタ。初島氏カラ送付サレタテニアン島ノ標本ニツイテ調べテ見タ所、確ニ小笠原島産ノモノト同種デアル。シカシニューカレドニア産ノ眞ノ *M. tenuifolium* ハ DC. ノ Prodr. ニツイテ見ルニ “...., limbæ corollæ imberbi. トワザワザ斷ツテアリ、又 F. MUELLER ノ Fragmenta Phytographiæ Australiæ ニツイテ見テモ “Lobus corollæ infimus saepe barbatus” トアリ花冠ノ邊緣部ハトモカクソノ基部ノ方ニハ毛ノアルモノデアラシイ。コノ事ハ BENTHAM ノ Flora Australiensis ノ *M. acuminatum* ノ項ノ所ニモホノメカサレテキル。小笠原島産ノモノハ花冠ハ全然無毛デアル。*Myoporum* ノ種類ノ分布ハ一般ニ案外ニ狭イモノデアルカラ、小生ハマリアナ群島産ノモノハ濠洲方面ノモノニ關係ガナク、小笠原島カラ南下ジテ分布シタモノト考ヘテキル。小笠原島デハ最北端ノ釐島列島カラ父島マデ分布シテキテ、母島列島ニハ小サナ屬島ニノミ生ジテキル。(津山 尙)